

COLLES REHAUSSEMENT DE CILS



Gammes produits concernés

Colles de rehaussement de cils : ref. 138002, 138000, 138008, 138010



Composants

La liste détaillée des ingrédients est disponible sur demande auprès de votre formatrice Peggy Sage ou directement sur l'étiquetage des produits.



Dangers identifiés

- Effectuer un test de sensibilité, pour les produits ci-dessous, derrière l'oreille ou au creux du coude de la cliente, 48h avant de les utiliser, afin de déceler toute allergie ou risques de réaction :
 - Colle 138008
 - Crème permanente et crème fixatrice 138001 (contenu dans le kit rehaussement de cils)

Mode d'utilisation

- Réservé aux professionnels.
- Lire attentivement le mode d'emploi.
- Avant et après ouverture, les produits doivent être maintenus à température ambiante et à l'abri du soleil.
- Agiter avant emploi.
- Ne pas frotter ses yeux pendant les 6 heures qui suivent le rehaussement.

Précautions d'utilisation



- Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements.
- Avoir une pièce de travail bien aérée.
- Bien se laver les mains avant et après chaque rehaussement de cils.
- Il est recommandé de porter des gants pour une hygiène parfaite.
- Se renseigner sur les antécédents ophtalmologiques de la cliente (maladies de l'œil).
- Ne pas utiliser les produits si les yeux présentent une irritation, une inflammation ou toute autre blessure.
- Demander à la cliente si elle porte des lentilles. Si tel est le cas, bien lui faire retirer avant le rehaussement.
- Il est recommandé d'éviter de rentrer en contact direct avec l'eau et de se gratter les yeux pendant les 6h qui suivent le rehaussement de cils.
- Passé ces 6h, contrairement aux extensions de cils, il n'y a aucune précaution à prendre de la part de la cliente. Il est possible de se maquiller et de se démaquiller normalement et d'entrer en contact avec de l'eau.

Que faire en cas de

- Si les paupières de la cliente sont collées en fin de prestation, appliquer une compresse tiède, l'œil s'ouvrira.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un ophtalmologiste.
- En cas d'inhalation : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.

Lors de toute consultation médicale, pensez à vous munir de l'emballage du produit.